



MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC

TILT[®]
250 EC

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe-
sygdomme på korn, frøgræs, plæner og bederoer.



Svampemiddel



Advarsel

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Irriterer øjnene og huden (R36/38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/R53).

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Dampene kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

Undgå indåndning af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejde.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn, frøgræs, plæner og bederoer.

Må i korn, frøgræs og bederoer ikke anvendes senere end 30 dage før høst.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Produktet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten. Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Svampemiddel nr. 1-4. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Propiconazol 250 g/l (25,3%)

Godkendelsesindehaver: Syngenta Crop Protection A/S,
Strandlodsvej 44, DK-2300 København S

Nettoindhold 5 liter

Fabr. nr.:

Irvtva Plant Protection N.V.

Member of the Maktshim-Agan Group, www.mabeno.com

UN 1993

L125985
1341-NOV 06-AF



Miljøfarlig



Sundhedsskadelig

TILT® 250 EC Brugsanvisning

Grundlæggende undersøgelser:

Swampemiddel nr. 1-4, Tilt 250 EC, er undersøgt i henhold til gældende lovgivning og på baggrund heraf tilladt af Miljøstyrelsen til bekæmpelse af svampesygdomme i korn, bederoer, frøgræs og plæner.

Kun plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt af Miljøstyrelsen må markedsføres.

Til grund for tilladelsen ligger omfattende undersøgelser af midlet og dets aktivstof udført af autoriserede institutioner. Disse undersøgelser omfatter bl.a. giftighed overfor pattedyr, fugle, fisk, andre vandlevende og jordlevende organismer, effekt på arvelige egenskaber, fostre og formeringssevne, nedbrydning i jord, planter og restkoncentration i afgrøder m.m. Både Syngenta Crop Protection A/S og Miljøstyrelsen har vurderet disse undersøgelser og tilladelsen er givet i henhold til etikettens afsnit "Advarsel" og til brug som anført under brugsanvisning.

Afgrøder/sygdomme:

Tilt 250 EC anvendes mod blad- og akssygdomme i korn og frøgræs samt visse sygdomme i plæner og bederoer. I korn og frøgræs anbefales Tilt 250 EC især i kombination med Tern eller en strobilurin. Tilt 250 EC er et bredtvirkende svampemiddel til bekæmpelse af almindeligt forekommende svampesygdomme som meldug, septoria (hvedebrunplet, hvedegråplet), hvedebladplet (DTR), gulrust, brunrust, bygrust, skoldplet og bygbladplet i korn, meldug og rust i frøgræs, bedemeldug i bederoersamt mod meldug, rust og visse bladpletsygdomme i plæner.

Velegnet i	Byg	Hvede	Græsfrø	Bederoer
stadium BBCH	26-51	26-59	maj	juli/august

Dosering: Normaldosering 0,5 l/ha Tilt 250 EC.

Hvede:

Ved tidlige og kraftige meldugangreb i hvede anvendes en blanding af Tern+Tilt 250 EC (0,5+0,5) l/ha stadie BBCH 26-37. På allerede etableret septoriaangreb anvendes Tilt 250 EC+Amistar (0,5+ strobilurin) l/ha på stadium BBCH 37-59

Vårbyg:

I meldugresistente sorter kan anvendes 0,3-0,5 l/ha Tilt 250 EC. I ikke resistente sorter anvendes blandingen af Tilt 250 EC+Tern (0,3-0,5+0,5) l/ha stadie BBCH 31-39.

Bederoer og plæner:

På plæner og i bederoer anvendes TILT 250 EC, når angreb er konstateret. Specielt ved lave doseringer udføres sprøjtningen så snart de første sygdomstegn viser sig.

Tilberedning af sprøjttevæskens:

Fyld tanken halvt med vand, tilsæt TILT 250 EC og eventuel blandingspartner under omrøring. Der omrøres under udspøjtning. Udsprøjtningen bør afsluttes senest få timer efter blanding.

Sprøjteteknik

Dyse	Bar	Km/t	L/ha
ISO-F-025-110 Lilla	3	5,9	200
ISO-F-02-110 Gul	3	6,4	150

Ved optimal sprøjteteknik og optimale vejforhold kan vandmængden ned-sættes til 120 l/ha.

Langtidsbeskyttelse:

I normaldoseringen på 0,5 ha beskytter TILT 250 EC afgrøden mod de nævnte svampesygdomme i op til 4 uger. Anvendes der lavere doseringer, reduceres langtidsbeskyttelsen tilsvarende.

Vejrforhold:

TILT 250 EC bekæmper svampesygdomme, så snart afgrøden er i vækst (allerede fra temperatur på 6°C, men dog bedst ved 10°C). Ved stærk solskin og ved temperatur over 25°C bør sprøjtningen udføres efter klokken otte om aftenen eller før klokken seks om morgenen. Regn 1 time efter udbringning påvirker kun TILT 250 EC effekten minimalt.

Systemisk virkning:

TILT 250 EC er et systemisk, bredtvirkende svampemiddel, der hurtigt optages i planterne og fordeles med den op- og udadgående saftstrøm til alle stængel- og bladele, herunder ny tilvækst.

Tankblandinger:

Alle nævnte produkter kan anvendes i tankblanding med TILT 250 EC under forudsætning af, at brugstidspunktet for begge produkter er sammentaldende.

Midler mod en- og tokimbladet ukrudt:

MCPA, Briotril® 400 EC, Express® ST, Harmony®, Ally® ST, Harmony Plus® ST, Oxitril® CM, Ariane FG®, Stomp® SC, Starane® 180S, Tomahawk®180 EC.

Midler til vækstregulering: CCC, Cerone®, Terpal®, Moddus® M.

Plantetrimmer: Moddus®

Midler mod bladsygdomme: Tern®, Amistar®, Comet®, Opus®.

Midler mod skadedyr: Mavrik® 2F, Pirimor®, Fastac® 50, Karate® 2,5 WG.

Chelaterede næringsstoffer: mangan, magnesium.

© registrerede værmerker Bayer, BASF, DuPont, Dow, Syngenta og Makhteshim-Agan

Tom emballage:

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjttevæsken.

Produktansvar:

Informationen om produktets anvendelse er baseret på producentens seneste erfaringer, og er derfor alene at forstå som anbefalinger. Mange faktorer, såsom vejrforhold, jordtype, sorter, resistens, sprøjteteknik og andre anvendelsesmetoder kan påvirke produktets effekt.

Makhteshim-Agan Holland B.V. påtager sig intet ansvar for følgerne af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af produktet eller for anvendelse af produktet i strid med medfølgende instruktioner, ligesom Makhteshim-Agan Holland B.V. ikke påtager sig ansvar for indirekte tab, herunder driftstab, anvættat og lignende. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten på dunken før brug.

Anerkendelse



Anerkendt af Danmarks JordbrugsForskning til bekæmpelse af meldug på hvede, bygbladplet, skoldplet og bygrust på byg, hvedebrunplet, hvedegråplet, brunrust og gulrust på hvede med 0,5 liter/ha.

MAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDICMAKHTESHIM
A G A N
BENELUX & NORDIC**TILT**[®]
250 EC**Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn,
frøgræs, plæner og bederoer.****4 x 5 liter****4 x 5 liter****Svampemiddel****Advarsel****For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.**

Irriterer øjnene og huden (R36/38).

Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43).

Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R51/R53).

Farlig; kan give lungeskade ved indtagelse (R65). Dampe kan give sløvhed og svimmelhed (R67).

Undgå indåndning af aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Brug egnede beskyttelsehandsker under arbejdet.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt lovpligtige leverandørbrugsanvisningen samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme på korn, frøgræs, plæner og bederoer.**Må i korn, frøgræs og bederoer ikke anvendes senere end 30 dage før høst.****Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.****Produktet må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra vandmiljøet (vandløb og søer m.v.).****Opbevares utilgængeligt for børn.****Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.****Førstehjælp:** Ved mistanke om forgiftning kontakt læge og vis etiketten. Kommer midlet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Læs desuden afsnittet om førstehjælp på leverandørbrugsanvisningen.

Svampemiddel nr. 1-4. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Analyse: Propiconazol 250 g/l (25,3%)**Godkendelsesindehaver:** Syngenta Crop Protection A/S,
Strandlodsvej 44, DK-2300 København S


Fabr. nr.:

Irvita Plant Protection N.V. - Member of the Makhteshim-Agan Group
www.mabeno.com**Nettoindhold 4 x 5 liter**

UN 1993

L125983
1341-NOV 06-C

Miljøfarlig



Sundhedsskadelig